

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés
Coprantol Duo	Gombaölő szer	Szőlő (bor és csemege)	réz-hidroxid	50	21	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) bogyószíneződésig (BBCH 83)
			réz-oxiklorid	50		
		alma	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): varasodás, tűzelhalás (ervíniás elhalás) esetén levélrügyduzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03) teljes virágzásig (BBCH 65). Kijuttatás időpontja: varasodás, baktériumos és gombás ágelhalás esetén levélhullás kezdetétől (BBCH 91) levélrügy duzzadás végéig (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03)
			réz-oxiklorid	5		

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés
Coprantol Duo	Gombaölő szer	körte	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): varasodás, tűzelhalás (ervíniás elhalás) esetén levélrügyduzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03) teljes virágzásig (BBCH 65). Kijuttatás időpontja: varasodás, baktériumos és gombás ágelhalás esetén levélhullás kezdetétől (BBCH 91) levélrügy duzzadás végéig (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03)
			réz-oxiklorid	5		
		birs	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): varasodás, tűzelhalás (ervíniás elhalás) esetén levélrügyduzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03) teljes virágzásig (BBCH 65). Kijuttatás időpontja: varasodás, baktériumos és gombás ágelhalás esetén levélhullás kezdetétől (BBCH 91) levélrügy duzzadás végéig (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03)
			réz-oxiklorid	5		

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés	
Coprantol Duo	Gombaölő szer	naspolya	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): varasodás, tűzelhalás (ervíniás elhalás) esetén levélrügyduzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03) teljes virágzásig (BBCH 65). Kijuttatás időpontja: varasodás, baktériumos és gombás ágelhalás esetén levélhullás kezdetétől (BBCH 91) levélrügy duzzadás végéig (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03)	
			réz-oxiklorid	5			
		őszibarack	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges		
			réz-oxiklorid	5			
		nektarin	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 2,8-3,9 kg/ha dózisban levélsárgulás kezdetétől (BBCH 91) levélrügyduzzadásig (BBCH 02). 2,8-3,2 kg/ha dózisban levélrügyduzzadás végétől (BBCH03) szíromlabda állapotig (BBCH 59).
			réz-oxiklorid	5			

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés
Coprantol Duo	Gombaölő szer	kajszi	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint):2,8-3,9 kg/ha dózisban levélsárgulás kezdetétől (BBCH 91) levélrügyduzzadásig (BBCH 02). 2,8-3,2 kg/ha dózisban levélrügyduzzadás végétől (BBCH03) sziromlabda állapotig (BBCH 59).
			réz-oxiklorid	5		
		szilva	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint):2,8-3,9 kg/ha dózisban levélsárgulás kezdetétől (BBCH 91) levélrügyduzzadásig (BBCH 02). 2,8-3,2 kg/ha dózisban levélrügyduzzadás végétől (BBCH03) sziromlabda állapotig (BBCH 59).
			réz-oxiklorid	5		
		cseresznye	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint):2,8-3,9 kg/ha dózisban levélsárgulás kezdetétől (BBCH 91) levélrügyduzzadásig (BBCH 02). 2,8-3,2 kg/ha dózisban levélrügyduzzadás végétől (BBCH03) sziromlabda állapotig (BBCH 59).
			réz-oxiklorid	5		

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés
Coprantol Duo	Gombaölő szer	meggy	réz-hidroxid	5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 2,8-3,9 kg/ha dózisban levélsárgulás kezdetétől (BBCH 91) levélrügyduzzadásig (BBCH 02). 2,8-3,2 kg/ha dózisban levélrügyduzzadás végétől (BBCH03) sziromlabda állapotig (BBCH 59).
			réz-oxiklorid	5		
		komló	réz-hidroxid	1000	14	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): indanövekedés végétől (BBCH 39) tobozok szedésérettségéig (BBCH 89)
			réz-oxiklorid	1000		
		burgonya	réz-oxiklorid	5	14	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 leveles állapottól (BBCH 15) bogyóérésig (BBCH 85)
			réz-oxiklorid	5		
		dísznövények	réz-hidroxid	-	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	nincs korlátozás
			réz-oxiklorid	-		