

## **Trónkövetelő a szőlőbetegségek között - A szőlő feketerothadása**

Hír

2019.11.12.

**Már az ezredforduló óta Magyarországon is megtalált betegség a szőlő feketerothadás (kórokozó: *Guignardia bidwellii*), de jelentős problémát eddig csak bizonyos évjáratokban okozott.**


A szőlő minden zöld részét megtámadhatja (fürt, levél, hajtás, kacs), és a beteg részekben könnyedén át is teleg. A fertőzés kialakulásának alapfeltétele a megfelelő hőmérséklet (20°C felett), és nedves párás körülmények. Ha ideálisak a feltételek akár 6 óra alatt is lezajlik a fertőzési folyamat. Ha nem védekezünk ellene megfelelő készítményekkel akár 80% termésveszteséget is okozhat.

Fontos a védekezést komplexen végezni, és nem kizárólag növényvédelmi készítményekre hagyatkozni. A vékony szellős, gyorsan száradó lombzat kulcskérdés. A legnagyobb fertőzési forrást a területen maradó fertőzött növényi részek jelentik. A gépi szüret előtérbe kerülésével gyakran a fertőzött fürtkocsány is például ottmarad a területen, így biztosítva az áttelelést. A fertőzött növényi részeket minél hamarabb el kell távolítani a területről!

A növényvédelmi kezeléseket 10 cm-es hajtáshossztól érdemes elkezdni, preventíven. A Syngenta kínálatában a [Dynali](#)-nak (0,65 l/ha) van a legkiemelkedőbb hatékonysága feketerothadás ellen.



*Feketerothadás fürtön*



*Feketerothadás hajtáson*



*Feketerothadás levélen*

*Képek Schmidt Ágnes felvételei*