

Chorus 50 WG



Chorus 50 WG

Utolsó módosítás:

2019.06.11.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

Kiszerezés:

300 g, 1 kg

Hatóanyagtartalom:

500 g/kg

ciprodinil

Hatóanyag család:

anilin-pirimidin

Formuláció:

WG (vízben diszpergálható granulátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Számos kertészeti kultúrában alkalmazható

varasodás, monília, szürkepenész elleni gombaölő szer.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra

Kórokozó

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	ventúriás varasodás és monília	0,4-0,45 kg/ha A Chorus-t kifejezetten a korai varasodásfertőzések ellen fejlesztették ki. Ez általában egérfül állapot és a virágzás időszakában, az aszkospóra-szóródás kezdetétől van. A Chorus szisztémikus készítmény (2 óra alatt felszívódik) és belülről véd, kuratív hatással rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy alacsony hőmérsékleten is hat, még fagypont közeli hőmérsékleten is alkalmazható. A Chorus-t egérfül állapottól szíromhullásig lehet kijuttatni 1-4 alkalommal. Lisztharmatra fogékony (pl. Jonathan) fajtában a Chorus-t egészítsük ki Thiovit Jet-tel.	21 nap
csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajsziarack, őszibarack, szilva) mandula)	monília	0,35-0,4 kg/ha A monília elleni védekezést a fehér bimbós állapot elején kell elkezdni. A második kezelésre teljes virágzásban kerüljön sor. Egy tenyészidőszakban maximum 3 kezelés végezhető.	14 nap
szőlő	szürkepenész	0,75 kg/ha Szőlőben szürkepenész ellen a fürtzáródás kezdetekor, preventíven vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell védekezni. Egy tenyészidőszakban maximum 1 kezelés végezhető.	14 nap
málna, szeder	botritiszes betegség, szederrozsa	0,75-0,9 kg/ha Málnában szürkerothadás ellen a virágzás kezdetétől érés kezdetéig (az adott élelmezésügyi várakozási időt betartva), szederben szederrozsa ellen hajtásnövekedés kezdetétől célszerű kijuttatni 800-2000 l/ ha vízmennyiséggel, jó permetléfedést biztosító kijuttatástechnika alkalmazásával. Egy tenyészidőszakban maximum 3 kezelés végezhető.	14 nap
szamóca	botritiszes betegség	0,75 kg/ha Egy tenyészidőszakban maximum 3 kezelés végezhető.	3 nap
spárga	spárgarozsa	0,9 kg/ha A kezelést a spárgacsíkok betakarítása után kell elvégezni, maximum 3 alkalommal.	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs további korlátozás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)

Szűrés növénykultúra szerint

- Mind - ▼

Apply

1

[Következő](#)

Alma

Birs

Cseresznye

Kajsziarack

Körte

Málna

Mandula

Meggy

Naspolya

Őszibarack

1

[Következő](#)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)



SGH09

Figyelmeztetés

Figyelem

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
- Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH208 Ciprodinilt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő
- Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199