

Neoram 37,5 WG



Neoram 37,5 WG

Utolsó módosítás:

2019.07.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

Kiszerezés:

5 kg

Hatóanyagtartalom:

63 %

rézoxiklorid (375 g/kg fémréz)

Formuláció:

WG (vízben diszpergálható/oldható granulátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Nagy tisztaságú, irányított szemcsemérettel formulázott, réz tartalmú gombaölő permetezőszer.

Almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, szőlő, paprika, paradicsom, burgonya, bab, borsó, kabakosok, hagymafélék, cukorrépa, konyha- és édeskömény, orvosi csucsor betegségei ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra	Kórokozó	A kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha)	víz (l/ha)	Dózis, kijuttatási időpont	É.V.I.
---------	----------	--	------------	----------------------------	--------

almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) /tavaszi lemosó- és nyár végétől záró permetezésre/	baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, tűzelhalás (Erwinia)	3,0-4,0	800-1500	A készítményt preventív jelleggel, (fertőzésveszélyes időszakban, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor), szükséges kijuttatni a lombfelülethez megválasztott lémennységgel (le mosó permetezésnél 1000-2000 l/ha vízmennyiséggel). Lemosó permetezésnél ügyelni kell, hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapokat is teljes mértékben, áztatásszerűen fedje, amely hatás nedvesítőszert alkalmazásával fokozható. A fertőzésveszély fennállása alatt (hűvös, csapadékos időjárási viszonyoknál) szükség szerint – általában 7-10 napos permetezési fordulót alkalmazva – kell ismételni a kezeléseket. Rézérzékeny gyümölcsféléknél (alma, körte, kajszi, őszibarack) színes bimbós állapotban be kell fejezni a készítménnyel való védekezést, azt csak a termés viaszosodása után, nyár közepétől (alma, körte), illetve a termésszedést követően, ősszel (őszibarack), vagy a lombhullás előtt és lombhulláskor szabad folytatni (kajszi).	10 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	varasodás	2,0-2,5	600-1500	A fertőzésveszély fennállása alatt (hűvös, csapadékos időjárási viszonyoknál) szükség szerint – általában 7-10 napos permetezési fordulót alkalmazva – kell ismételni a kezeléseket. Rézérzékeny gyümölcsféléknél (alma, körte, kajszi, őszibarack) színes bimbós állapotban be kell fejezni a készítménnyel való védekezést, azt csak a termés viaszosodása után, nyár közepétől (alma, körte), illetve a termésszedést követően, ősszel (őszibarack), vagy a lombhullás előtt és lombhulláskor szabad folytatni (kajszi).	
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, barack, nektarin, szilva); héjasok (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)	baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, levél- lyukacsosodás, monília, apiognómia, tafrina	2,0-2,5	600-1500	Lakossági felhasználási dózis: - ültetvényekben: 25-90 ml/8-12 liter víz/100 m ²	21 nap

szőlő	peronoszpóra, orbánc	1,75-2,0 (virágzás előtt) 2,0-2,5 (virágzás után)	600-1000	Virágzás előtt illetve virágzást követően javasolt kijuttatni. Lakossági felhasználási dózis: - ültetvényekben: 25-90 ml/8-12 liter víz/100 m ²	21 nap
paprika	baktériumos betegségek	1,5-2,0	400-800	Maximum 6 alkalommal (2-4 valódi leveles állapot és termésszedés közötti időszakban, 6-8 naponként) kell a védekezést folytatni.	7 nap
paradicsom, burgonya	baktériumos betegségek, fitoftóra	2,0-2,5	400-800		7 nap
bab	baktériumos betegségek, fenésedés, babrozsa	1,5-2,0	400-800		5 nap
borsó	baktériumos betegségek, fenésedés, borsórozsa	1,5-2,0	400-800	Lakossági felhasználási dózis: - zöldségnövényeknél: 25-45 ml/4-6 liter víz/100 m ²	5 nap
kabakosok (uborka, dinnye, tök)	peronoszpóra, pszeudo-monászos fertőzés, fenésedés	1,5-1,8	400-800		5 nap
hagymafélék (vörös-, zöld-, fok-, póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma)	baktériumos betegségek, peronoszpóra	2,0-2,5	400-800		21 nap
cukorrépa	cerkospórás, ramuláris és fómás levél-betegségek	2,0-2,5	400-800		21 nap
konyha- és édeskömény	peronoszpóra	2,0-3,0	400-800		Rendeltetés szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.
orvosi csucsor	fitoftóra	2,0 - 3,0	400-800		

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)

Továbbiak

Szűrés növénykultúra szerint

- Mind - ▼

Apply

1

[Következő](#)

Alma

Bab

Birs

Borsó

Burgonya

Cseresznye

Cukorrépa

Dinnye

Dió

Édeskömény

1

[Következő](#)

•

**Címke és csomagolás
osztályozása (CLP)**



SGH09

Figyelmeztetés

Figyelem

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 1 A talajvíz és a talaj élő szervezeteinek védelme, a talajban történő felhalmozódásának elkerülése érdekében a készítményt ne használja az előírt gyakoriságnál többször.
- SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknak és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország:

06/1/488 2288 Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199
