

## Thiovit Jet



# Thiovit Jet

Utolsó módosítás:  
2020.05.07.

## Gombaölő szer

### Növényvédő szer

**Kiszerelés:**

1 kg  
20 kg

**Hatóanyagtartalom:**

800 g/kg  
kén

**Formuláció:**

WG (vízben diszpergálható granulátum)

**Környezeti besorolás:**

Vízi szervezetek: nem jelölésköteles. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Modern kénkészítmény.

Könnyen szuszpendálódik, a permetlében a kisebb és nagyobb kén szemcsék aránya optimális. Ennek következtében kitűnő a hatékonysága, a kultúrnövényt nem perzseli.

#### HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		ÉVI  Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer mennyiség kg/ha	víz mennyiség l/ha	

szőlő ( <i>bor-, csemege-</i> )	lisztharmat	10	7	3,0-8,0	300-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	rügyfakadást követően a zöld hajtáscsúcsok láthatóvá válásától (BBCH 09) érés kezdetéig (BBCH 81)
almatermésűek ( <i>alma, körte, birs, naspolya</i> )	lisztharmat gyenge ventúriás varasodás fertőzés	10	7	3,0-8,0	500-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	egérfüles állapottól (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulása (BBCH 85)
csonthéjasok ( <i>cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, nektarin, szilva</i> )	lisztharmat gyenge sztigmina (levéllyukacsosodás) fertőzés	10	7	3,0-7,5	500-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	levélkezdemények megjelenésétől (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig (BBCH 85)
kalászosok ( <i>búza, árpa, zab, rozs, tritikálé</i> )	lisztharmat	3	7	5,0-7,5	200-500	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	bokrosodás kezdetétől (BBCH 21) virágzás végéig (BBCH 69)
paprika, paradicsom, tojásgyümölcs	lisztharmat	5	7	3,0-7,0	200-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88)
cukorrépa	lisztharmat	4	7	5,0-7,0	200-500	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)
sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon	lisztharmat	6	7	3,0-7,5	200-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88)
hüvelyesek ( <i>száraz bab, száraz borsó, zöldborsó, lencse, zöldbab, fejtett bab</i> )	lisztharmat	4	7	2,0-4,0	400-800	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	háromleveles állapottól (BBCH 13) végső hüvelyméretig (BBCH 79)
sárgarépa, pasztinák, zeller, retek, bakszakáll, cékla	lisztharmat	4	7	2,0-4,0	400-800	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	4-5 leveles állapottól (BBCH 15) gyökernövekedés végéig (BBCH 49)
cikória	lisztharmat	4	7	2,0-4,0	400-800	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	levél és hajtásnövekedés időszakában (BBCH 11-49)

számóca	lisztharmat	3	10	3,0-4,0	400-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	a 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90)
málna, ribiszke ( <i>piros, fekete</i> ), kőszméte, szeder, szeder málna, áfonya, gyepürózsa	lisztharmat	4	7	3,0-7,0	500-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	levélrügy pattanásától (BBCH 07) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90)
gyógy- és fűszernövények ( <i>macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsikafű, izsóp, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, levendula, gyűszűvirág, mustár, cickafark, vasfű, lórom, zsálya, orvosi ziliz, articsóka, mórmályva, útifű (keskeny levelű), sáfrányos szeklice, máriatövis</i> )	lisztharmat	3	10	2,0-5,0	200-800	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	hajtásnövekedés időszakában (BBCH 15-49)
tölgy	lisztharmat	3	7	1,5-3,0	600-1500	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	rügypattanástól (BBCH 07) levélsárgulás kezdetéig (BBCH 92)
közterületi díszfák, díszcserjék	lisztharmat	5	7	2,5-5,0	600-1500	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	első levelek kiterülésétől (BBCH 11) teljes levélhullásig (BBCH 97)
dísznövények (hajtatott)	lisztharmat	10	10	2,5-5,0	500-1000	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	levél és hajtásnövekedés időszakában (BBCH 11 - 89)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

## Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)
- [Megjegyzések](#)

Szűrés növénykultúra szerint

- Mind - ▼

Apply

1

[Következő](#)

**Áfonya**

**Alma**

**Árpa**

**Bakszakáll**

**Birs**

**Borszőlő**

**Búza**

**Cékla**

**Cikória**

### Következő

#### Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyept) biztonsági övezetet!
- A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületről szőlő kultúrában 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett a biztonsági övezet megtartása nem szükséges.
- Almatermésű és csonthéjas kultúrákban 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m, 75%-os szórófej esetén 5 m védőtávolság szükséges.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280 Védőkesztyű használata kötelező.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknak: védőkesztyű
- Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

#### Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

- A készítmény 25°C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - nem alkalmazható!
- Az engedélyezett kultúrákban a készítmény **levél- és takácsatkák** gyérítésére is alkalmas.
- **A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.**
- **A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.**
- A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi

előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

---