

Reglone Air



Reglone Air

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

Kiszerezés:

5 l

20 l

Hatóanyagtartalom:

200 g/l

diquat-ion (374 g/l diquat-dibromid)

Formuláció:

SL (folyékony vízzeloldható koncentrátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

UTOLSÓ SZEZON 2019

Deszikkáló és gyomirtó szer.

Hatása gyors, a kezelést követő 7-10 napon belül a kultúrnövény betakarítható. Deszikkáló hatása teljes - a kultúrnövény mellett a gyomok jelentős részét is leszárítja. Lehetővé teszi a maximális termés betakarítását, megelőzve a gombabetegségeket és a madarak kártételét. Esőállósága kiváló, 15-30 perccel a kezelés után már nem mosódik le a levélről.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Gyomnövény

Kultúra

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

deszikkálás	borsó (takarmány), szója (takarmány)	1,5-2,0 l/ha – magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40% alatt van	7 nap
deszikkálás	olajlen	1,5-2,0 l/ha – amikor a termés 80-90%-a érett és barna színű, a magok a terméstartókban zörögnek	7 nap
deszikkálás	őszi káposztarepce, mustár, olajretek	1,5-2,0 l/ha – becőkben a magvak barnák, kimorzsolhatók, a magvak 35-40% nedvességtartalmúak, a tervezett betakarítás előtt legalább 7 nappal	7 nap
deszikkálás	magrépa	1,5-2,0 l/ha – amikor a gomolyok 80-90%-ban biológiailag érettek	7 nap
deszikkálás	napraforgó	1,5-2,0 l/ha – a kaszatok 25-30%-os nedvességtartalmánál	7 nap
egy- és kétszikű gyomnövények	szántóföldi kultúrák	1,0-1,5 l/ha – legkésőbb a kultúrnövény kelése előtt 4-5 nappal	
arankairtás (foltkezelés)	szántóföldi kultúrák	0,5%-os oldatban vetés után, kelés előtt, négyzetméterenként 1 l permetlé – az aranka magérlelése előtt	
egy- és kétszikű gyomnövények	3 évesnél idősebb szőlő (bor és csemege), almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringlő, szilva), héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)	2,0-2,5 l/ha – a gyomnövények 10-15 cm-es nagyságánál	30 nap

Légi kijuttatás:

- Kizárólag takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, napraforgóban, olajlenben, őszi káposztarepcebén, mustárban és olajretekben legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag (pl. Mist Kontrol) hozzáadásával, 50-60 liter/ha permetlé mennyiség felhasználásával.
- A **talajba vetett kultúrnövények kelése előtt** kinőtt gyomnövények leperzselése addig végezhető, amíg a kultúrnövény csíráit a föld megvédi a gyomirtó szertől, legkésőbb a kelés előtt 4-5 nappal.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)

- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)
- [Megjegyzések](#)

Szűrés növénykultúra szerint

- Mind - ▼

Apply

1

[Következő](#)

Almatermésűek (min. 3 éves) - alma, körte, birs, naspolya

Borsó (takarmány)

Csonthéjasok (min. 3 éves) - cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringlő, szilva

Cukorrépa (vetőmagtermesztés)

Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) - dió, mandula, mogyoró, gesztenye

Mustár

Napraforgó

Olajlen

Olajretek

Őszi káposztarepce

1

[Következő](#)



SGH05



SGH06



SGH08



SGH09

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

Figyelmeztetés

Veszély

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $KA < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
- SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m),
- más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H302 Lenyelve ártalmas.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H331 Belélegezve mérgező.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- EUH208 Diquát dibromid-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

- P234 Az eredeti edényben tartandó.
- P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/ arcvédő használata kötelező.
- P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P311 Forduljon orvoshoz.
- P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
- P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő, védőszemüveg.
- Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyébkorlátozás nem szükséges.

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

- A talajba vetett kultúrnövények kelése előtt kinőtt gyomnövények leperzselése addig végezhető, amíg a kultúrnövény csíráit a föld megvédi a gyomirtó szertől, legkésőbb a kelés előtt 4-5 nappal.
- Készítményt szántóföldi géppel 300-600 l/ha, légi úton 50-60 l/ha permetlémennyiséggel kell kijuttatni. A légi kijuttatásra vonatkozó rendelet betartása kötelező!
- Légi kijuttatás kizárólag takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, napraforgóban, olajlenben, őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 l/ha permetlémennyiség felhasználásával.

- Szőlő- és gyümölcsorok kezelése a gyomok 10-15 cm-es magasságánál, hektáronként 400-600 l permetlével végezhető úgy, hogy a vegyszer a kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön.
 - A Reglone Air hatásgyorsasága 4 kg/ha ammónium-nitrát hozzáadásával fokozható.
 - A kezelt kultúrnövények betakarítása után keletkező szalmát, ocsút stb. takarmányozási célra tilos felhasználni.
-