

Force 1,5 G



Force 1,5 G

Utolsó módosítás:

2019.10.01.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

Kiszerezés:

0,5 kg

20 kg

Hatóanyagtartalom:

15 g/kg

teflutrin

Hatóanyag család:

piretroidok

Formuláció:

GR (granulátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Piretroid típusú rovarölő talajfertőtlenítő granulátum.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási
időpont

É.V.I.

kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	
	kukoricabogár	12-15 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	
burgonya, cukorrépa, napraforgó, paprika, paradicsom, káposztafélék (brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, kínai kel, karalábé) /magról vetett, szabadföldi/ gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, cékla), levélzöldségek (spenót, sóska, saláta), zöldbab, borsó, kabakosok (görögdinnye, sárgadinnye, uborka, tök), hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma)	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.
almatermésűek (körte, birs, naspolya), csonthéjasok (kajsziarack, őszibarack, meggy, nektarin, szilva, cseresznye), szőlő	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	
csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskola	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	15-20 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	
bogyós gyümölcsűek (szamóca, feketeszeder, hamvas szeder, szeder málna, málna, fürtös áfonya, nagytermésű tőzegáfonya, ribiszke, köszméte, fekete bodza, josta, csipkebogyó)	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	

Megjegyzések:

- **Szántóföldi kultúrákban** a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni.
- **Zöldségfélékben** vetéssel, ültetéssel egy menetben sorkezeléssel, megfelelő kijuttató eszközzel kell alkalmazni. **Ültetvények** esetében telepítéskor a készítményt a telepítendő növény gyökérzónájába kell elhelyezni, **szőlő** esetében 40-60 cm, **gyümölcsfélék** (almatermésűek, csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek) esetében 20-40 cm, **csemete-, mag-, dugvány- és oltvány iskola** estében 10-15 cm mélységben. **Házi kerti** felhasználás esetén a szert az ültető gödörbe, a telepítendő növény gyökérzónájába kell elhelyezni.
- **Drótféreg** fertőzés esetén a magasabb dózis használata javasolt. Erős fertőzés esetén – ha a drótféreg száma négyzetméterenként 4-8 egyed, vagy ennél több – a talajfertőtlenítés nem elegendő, vetésváltásra van szükség. Ilyen esetben a drótféreg kártételére kevésbé érzékeny, egynyári hüvelyeseket, vagy keresztesvirágú olajos növényeket ajánlatos vetni.
- **A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét!**

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)
- [Megjegyzések](#)

[Engedélyezett felhasználás](#)

[Force 1,5 G Almatermésűek](#)

Almatermésűek

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

[Force 1,5 G Borsó](#)

Borsó

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben, sorkezeléssel.	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Brokkoli

Brokkoli

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Burgonya

Burgonya

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Cékla

Cékla

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Csemegekukorica

Csemegekukorica

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

kukoricabogár

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
12-15 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Megjegyzések: Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő granulátumszóróval – a vetéssel egy menetben kell használni úgy, hogy a granulátum közvetlen a mag mellé kerüljön. Biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét. A kukoricabogár lárvái ellen az egyik leghatékonyabb készítmény, Amerikában a kártevő ellen a legszélesebb körben használt talajfertőtlenítő szer. A kukoricabogár mellett az egyéb talajlakó kártevők – pajorok, drótférgek – ellen is hatékony. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek – pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Megjegyzések:	Drótférgék ellen a magasabb dózis - 10 kg/ha - kijuttatása ajánlott. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek - pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.		
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskola

Csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskola

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Cseresznye

Cseresznye

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Csipkebogyó

Csipkebogyó

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Cukorrépa

Cukorrépa

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Fejeskáposzta

Fejeskáposzta

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Feketebodza

Feketebodza

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Fürtös áfonya

Fürtös áfonya

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma)

Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma)
Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Josta

Josta

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Kajsziarack

Kajsziarack

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Karalábé

Karalábé

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Karfiol

Karfiol

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Kelbimbó

Kelbimbó

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Kelkáposzta

Kelkáposzta

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Kínai kel

Kínai kel

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Köszméte

Köszméte

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Kukorica (takarmány)

Kukorica (takarmány)

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

kukoricabogár

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
12-15 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Megjegyzések: Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő granulátumszóróval – a vetéssel egy menetben kell használni úgy, hogy a granulátum közvetlen a mag mellé kerüljön. Biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét. A kukoricabogár lárvái ellen az egyik leghatékonyabb készítmény, Amerikában a kártevő ellen a legszélesebb körben használt talajfertőtlenítő szer. A kukoricabogár

mellett az egyéb talajlakó kártevők – pajorok, drótférgesek – ellen is hatékony. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek – pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Megjegyzések:	Drótférgesek ellen a magasabb dózis – 10 kg/ha – kijuttatása ajánlott. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek – pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.		
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Kukorica (vetőmag)

Kukorica (vetőmag)

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

kukoricabogár

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
12-15 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Megjegyzések:	Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő granulátumszóróval – a vetéssel egy menetben kell használni úgy, hogy a granulátum közvetlen a mag mellé kerüljön. Biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét. A kukoricabogár lárvái ellen az egyik leghatékonyabb készítmény, Amerikában a kártevő ellen a legszélesebb körben használt talajfertőtlenítő szer. A kukoricabogár mellett az egyéb talajlakó kártevők – pajorok, drótférgesek – ellen is hatékony. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek – pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.		
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Megjegyzések:	Drótférgek ellen a magasabb dózis - 10 kg/ha - kijuttatása ajánlott. A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek - pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.		
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Málna

Málna

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles.		

Force 1,5 G Meggy

Meggy

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
-------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Nagytermésű tőzegáfonya

Nagytermésű tőzegáfonya

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Napraforgó

Napraforgó

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Nektarin

Nektarin

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Őszibarack

Őszibarack

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Paprika

Paprika

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Paradicsom

Paradicsom

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel egy menetben.

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Pasztinák

Pasztinák

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Petrezselyem

Petrezselyem

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy

menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Ribiszke

Ribiszke

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Force 1,5 G Salátafélék

Salátafélék

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
-------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Sárgarépa

Sárgarépa

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Sóska

Sóska

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Spenót

Spenót

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles			

Force 1,5 G Szamóca

Szamóca

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Szeder (fekete, hamvas, szedermálna)

Szeder (fekete, hamvas, szedermálna)

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Szilva

Szilva

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Szőlő

Szőlő

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7,5-10 g/m ² adagban, sorkezelés formájában	ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Kabakosok

Tökfélék

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Force 1,5 G Zöldbab

Zöldbab

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: vetéssel, ültetéssel egy menetben.

Kezelések közötti min. időtartam:

-

talajlakó kártevők

Dózis	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
7-10 kg/ha adagban, sorkezelés formájában	vetéssel, ültetéssel egy menetben	Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.	5 m
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.			

Munkavédelmi és biztonsági előírások

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)



SGH09

Figyelmeztetés

Figyelem

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőkesztyű vagy védőlábbeli

Egyéb környezetvédelmi előírások

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Továbbiak

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

Megjegyzések

- Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő granulátumszóróval – a vetéssel egy menetben kell használni úgy, hogy a granulátum közvetlen a mag mellé kerüljön. Biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét.
 - A kukoricabogár lárvái ellen az egyik leghatékonyabb készítmény, Amerikában a kártevő ellen a legszélesebb körben használt talajfertőtlenítő szer. A kukoricabogár mellett az egyéb talajlakó kártevők – pajorok, drótférgesek – ellen is hatékony.
 - Drótférgesek ellen a magasabb dózis – 10 kg/ha – kijuttatása ajánlott.
 - A Force 1,5 granulátummal végzett talajfertőtlenítés után a szulfonilurea hatóanyagú gyomirtó szerek – pl. Milagro - a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók.
-