

## Magnello



# Magnello

Utolsó módosítás:

2020.05.07.

## Gombaölő szer

### Növényvédő szer

#### Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

#### Kiszerelés:

1 l

5 l

20 l

#### Hatóanyagtartalom:

100 g/l (9,93 m/m%)

difenokonazol

250 g/l (24,83 m/m %)

tebukonazol

Hatóanyag család:

triazolok

#### Formuláció:

EC (emulzióképző koncentrátum)

#### Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

A repce hibridek magas termőképességének kiaknázásához elengedhetetlen a tavaszi regulátorozás elvégzése. Ehhez olyan készítmény szükséges, ami egyben rendelkezik fungicid/gombaölő és regulátor/növekedésszabályozó képességekkel is. A Magnello 0,8 l/ha-os dózisban maradéktalanul eleget tesz az előbbieken említett kettős követelménynek. Előfordulhat, hogy az őszi meleg és hosszú, a repce ismételt regulátort igényel, ez esetben is megbízható megoldást jelent a Magnello.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra	Kórokozó	Dózis, kijuttatási időpont	É.V.I.
őszi búza	levél- és kalászbetegségek	1,0 l/ha utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): virágzás vége (BBCH69)	35 nap
őszi káposztarepce	fagykárcsökkentés, oldalhajtások képződésének fokozása alternáriás szár- és becőfoltosság, fómás levélfoltosság, fehérpenészes szárrothadás, fómás szárrákfoltosság	0,8 l/ha utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

## Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)
- [Megjegyzések](#)

## [Engedélyezett felhasználás](#)

### [Magnello Őszi búza](#)

Őszi búza

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: virágzás vége (BBCH69) (az utolsó kezelés időpontja, fenológiához viszonyítva).

**Kezelések közötti min. időtartam:**

-

### Levél- és kalászbetegségek

Dózis	Kezelések száma (max)	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
1,0 l/ha	Egy kezelés engedélyezett	Virágzás vége (BBCH69)	35 nap	5 m

**Megjegyzések:** A készítményt a különböző levél- és kalászbetegségek ellen, 1 l/ha dózisban, 250 – 400 l/ha lémenyiséggel javasoljuk felhasználni. A

készítménnyel gombabetegségek ellen évente 1 alkalommal (2 nóduszos állapotban, vagy kalászhányás végén, virágzás elején) célszerű védekezni. A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell elvégezni.

**Méhveszélyesség:** Nem jelölésköteles.

## **Magnello Őszi káposztarepce**

Őszi káposztarepce

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: sárgabimbós állapot (BBCH59) (az utolsó kezelés időpontja, fenológiához viszonyítva).

**Kezelések közötti min. időtartam:**

90 nap

### **Alternária**

<b>Dózis</b>	<b>Kezelések száma (max)</b>	<b>Utolsó felhasználás fenológia szerint</b>	<b>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő</b>	<b>Puffer zóna</b>
0,8 l/ha	2	sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap	5 m

**Megjegyzések:** A készítményt 350-400 l/ha permetlé mennyiséggel kell kijuttatni.

**Méhveszélyesség:** Nem jelölésköteles.

### **Fagykárcsökkentés**

<b>Dózis</b>	<b>Kezelések száma (max)</b>	<b>Utolsó felhasználás fenológia szerint</b>	<b>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő</b>	<b>Puffer zóna</b>
0,8 l/ha	2	sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap	5 m

**Megjegyzések:** A készítményt 350-400 l/ha permetlé mennyiséggel kell kijuttatni.

**Méhveszélyesség:** Nem jelölésköteles.

### **Fehérpenészes szárrothadás**

<b>Dózis</b>	<b>Kezelések száma (max)</b>	<b>Utolsó felhasználás fenológia szerint</b>	<b>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő</b>	<b>Puffer zóna</b>
0,8 l/ha	2	sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap	5 m

**Megjegyzések:** A készítményt 350-400 l/ha permetlé mennyiséggel kell kijuttatni.

**Méhveszélyesség:** Nem jelölésköteles.

### **Fóma**

Dózis	Kezelések száma (max)	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
0,8 l/ha	2	sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap	5 m
<b>Megjegyzések:</b>		A készítményt 350-400 l/ha permetlé mennyiséggel kell kijuttatni.		
<b>Méhveszélyesség:</b>		Nem jelölésköteles.		

### Oldalhajtások képződésének fokozása

Dózis	Kezelések száma (max)	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
0,8 l/ha	2	sárgabimbós állapot (BBCH59)	56 nap	5 m
<b>Megjegyzések:</b>		A készítményt szárbaindulástól tavasszal 350-400 l/ha permetlé mennyiséggel kell kijuttatni.		
<b>Méhveszélyesség:</b>		Nem jelölésköteles.		

## Munkavédelmi és biztonsági előírások

### Címke és csomagolás osztályozása (CLP)



SGH07



SGH08



SGH09

### Figyelmeztetés

Figyelem

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
- SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

### Különleges S-mondatok

### **Figyelmeztető mondatok (H-mondat)**

---

- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)**

---

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

### **Egyéni védőfelszerelés**

---

- Előkészítőknak: védőkesztyű
- Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védő lábbeli

### **Egyéb környezetvédelmi előírások**

---

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

## **Továbbiak**

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

## **Megjegyzések**

- Házikerti felhasználás: 7-10 ml /4-10 l víz /100m<sup>2</sup>
-