

H/13226/f

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓK: Baranyi Tibor  
Mészáros Ferencné

ENGEDÉLY SZÁMA: 39/2005.



TÁRGY: Force 1,5 G rovarölő  
talajfertőtlenítő szer forgalomba  
hozatali és felhasználási  
engedélyének módosítása és  
kiegészítése

OLDALAK SZÁMA: 2

## ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS

Syngenta Ltd.  
Nagy-Britannia

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a **Force 1,5 G** rovarölő talajfertőtlenítő szer 15991/2003. FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

*módosítom és egészítem ki:*

#### 4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (kg/ha)
kukorica ✓ (takarmány, csemege, vetőmag)	talajlakó kártevők	7,0-10,0 (sorkezelés)
burgonya, cukorrépa, napraforgó ✓	talajlakó kártevők (drótférgek, pajorok)	7,0-10,0 (sorkezelés)
paprika, paradicsom, káposztafélék (magról vetett, szabadföldi), gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, cékla), levélzöldségek (spenót, sóska, saláta), zöldbab, borsó, kabakosok (görögdinnye, sárgadinnye, uborka, tök), hagymafélék (vörshagyma, fokhagyma)	talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár pajorok)	7,0-10,0 (sorkezelés)

gyümölcsfélék (almatermésűek, csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek)	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7,5 -10,0 g/m <sup>2</sup> (sorkezelés)
szőlő	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	7,5 -10,0 g/m <sup>2</sup> (sorkezelés)
csemete-, mag-, dugvány-és oltványiskola	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	15,0-20,0 (sorkezelés)

### 5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő : előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.

### Melléklet

#### 1. Javasolt növényvédelmi technológia:

*Szántóföldi kultúrákban* a készítmény sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni.

*Gyümölcs, szőlő és zöldségfélékben* vetéssel, ültetéssel egy menetben sorkezeléssel, megfelelő kijuttató eszközzel kell alkalmazni.

Ültetvények esetében telepítéskor a készítményt a telepítendő növény gyökérszónájába kell elhelyezni, szőlő esetében 40-60 cm, gyümölcsfélék (almatermésűek, csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek) esetében 20-40 cm, csemete-, mag-, dugvány- és oltvány iskola estében 10-15 cm mélységben.

*Házi kerti felhasználás esetén* a szert az ültető gödörbe, a telepítendő növény gyökérszónájába kell elhelyezni.

Drótféreg fertőzés esetén a magasabb dózis használata javasolt. Erős fertőzés esetén – ha a drótféreg száma négyzetméterenként 4-8 egyed, vagy ennél több – a talajfertőtlenítés nem elegendő, vetésváltásra van szükség. Ilyen esetben a drótféregkártételre kevésbé érzékeny, egynyári hüvelyeseket, vagy keresztesvirágú olajos növényeket ajánlatos vetni.

A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét.

*Az engedélyokirat egyéb és a 46538/2004. FVM számú módosítás előírásai változatlanul érvényesek.*

**Budapest, 2005. március 7.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
főigazgató  
s.k.

**Dr. Ocskó Zoltán**  
engedélyezési igazgató  
s.k.

A kiadmány hiteléül:

Koch Katalin

Kapja: Syngenta Kft., Budapest.

(32/2005.)