

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Peak 75 WG	gyomirtó szer	kukorica (takarmány)	proszulfuron	0,01*	14 nap (siló)	kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
		az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges				
		kukorica (vetőmag)		-	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
		kukorica (csemege)		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
		cirok		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Peak 75 WG	gyomirtó szer	búza (őszi)	proszulfuron	0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás kezdetétől bokrosodás végéig (BBCH 21-29)
		árpa (őszi, tavaszi)		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	
		rozs		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	
		zab		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	
		tritikálé		0,01*	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges	

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja