

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG	EU MRL mg/kg	PHI (nap)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
Afinto	rovarölő szer	kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé)	flonikamid	Árpa, zab: 0,4 Búza, Rózsa, Tritikálé: 2	28 nap	bokrosodás vége – szemképződés (BBCH 29-71)
		burgonya		0,09	14 nap	sokleveles állapot – bimbósállapot (BBCH 19-55)
		almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)		0,3	21 nap	hajtásnövekedés kezdete – 50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 31-75)
		őszibarack		0,4	14 nap	hajtásnövekedés kezdete – 50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 31-75)
		cseresznye, meggy, szilva		cseresznye , meggy: 0,4 szilva: 0,3	cseresznye, meggy 14 nap szilva 21 nap	hajtásnövekedés kezdete – 50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 31-75)
		paprika (szabadföldi és hajatott)		0,3	5 nap	ötleveles állapot – bogyófejlődés (BBCH 15-71)
		hajatott paradicsom		0,5	3 nap	ötleveles állapot– az első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 15-71)
		hajatott uborka		0,5	3 nap	1 elsődleges oldalhajtás – az első termés teljes kifejlődése (BBCH 21-71)

		zöldborsó (hüvely nélkül)	0,7	14 nap	4 látható szárköz – a hüvelyek 50 %-a elérte a végleges nagysságot (BBCH 34-75)
		dohány	-	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	négyleveles állapot – virágbimbók megjelenése (BBCH 14-51)
		dísznövények (szabadföldi)	-	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	nincs korlátozva
		dísznövények (hajatott)	-	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	nincs korlátozva
		olajtök	0,06*	3 nap	1 elsődleges oldalhajtás – termésérés kezdete (BBCH 21-80)
		sárgadinnye, görögdinnye (szabadföldi)	0,4	1 nap	1 elsődleges oldalhajtás – termésérés kezdete (BBCH 21-80)

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja