

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL	PHI (nap)	Megjegyzés
Amistar Sun 325 SC	Gombaölő szer	ősz káposztarepce	azoxistrobin	0,7	56 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): az utolsó kezelési fenostádium: virágzás kezdetétől (BBCH 61) a fővirágzat 50%-os nyílásáig (BBCH 65)
			difenokonazol	0,5		
		napraforgó	azoxistrobin	0,5	56 nap	az utolsó kezelési fenostádium: 6 leveles állapotól (BBCH 16) virágzat elhajlása, szíromlevelek megjelenéséig (BBCH 59)
			difenokonazol	0,05*		
		száraz borsó	azoxistrobin	0,15	35 nap	első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77)
			difenokonazol	0,15		
		pannonbükköny	azoxistrobin	0,15	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77)
			difenokonazol	0,15		

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja