

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Syngenta Kft** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek az **Amistar Top gombaölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság az **Amistar Top gombaölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező **MGSZHK 02.5/2452/5/2008** számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

#### I. Az engedélyokirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. november 30.

#### II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

##### 6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis maximum (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva)
<b>paradicsom</b> (hajtatott)	fitoftóras, alternáriás, szeptóriás, kladospóriumos betegség, szürkepenész	3	8	0,6-1,0	400-600	érés BBCH 89
<b>paprika</b> (hajtatott)	kolletotrihumos, alternáriás betegség, paprikalisztharmat, szürkepenész	3	8	0,6-1,0	600-1000	terméskötődés BBCH 70
<b>tojásgyümölcs</b> (hajtatott)	szürkepenész, fitoftóras-, alternáriás betegség, lisztharmat	3	7	0,6-1,0	500-1000	érés BBCH89
<b>káposztafélék</b> (fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, karfiol, brokkoli)	káposztaperonoszpóra alternáriás, plenodómuszos betegség, lisztharmat	2	14	0,6-1,0	500-600	fejesedés BBCH 49

<b>gyökérzöldségek</b> (sárgarépa, petrezselyem, zeller)	peronoszpóra, rozstda, lisztharmat, alternáriás, szeptóriás betegség	2	14	0,6-1,0	400-600	gyökernövekedés vége BBCH 49
<b>spárga</b>	spárgarozsda	2	14	0,6-1,0	500-800	szárnövekedés vége
<b>póréhagyma</b>	alternáriás betegség, szürkepenész	3	12	0,6-1,0	400-600	szár megdőlés BBCH 48
<b>vöröshagyma, fokhagyma</b>	peronoszpóra, alternáriás betegség, szürkepenész	2	14	1,0	400-600	50 %-os fejátmérő BBCH 45
<b>mogyoróhagyma, újhagyma</b> (szabadföldi)	alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész	3	14	1,0	300-600	50 %-os fejátmérő – BBCH45
<b>szárazborsó</b>	lisztharmat, peronoszpóra, rozstda, aszkohtás betegség	2	14	1,0	400-600	A hüvelyek 70%-a elérte a végleges nagyságot BBCH 77
<b>petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor (levél), koriander</b>	peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész	2	14	1,0	400-600	80%-os gyökérvastagság BBCH 48
<b>torma</b>	albugós betegség, cerkospóra, lisztharmat	3	14	0,6-1,0	400-600	80%-os gyökérvastagság BBCH 48
<b>édesskömény</b>	lisztharmat, passzalórás betegség	3	12	0,6-1,0	300-600	betakarítás előtt 14 nappal
<b>spenót, sóska</b>	lisztharmat, peronoszpóra, rozstda	3	12	0,6-1,0	400-600	betakarítás előtt 14 nappal
<b>salátafélék</b> fejes saláta, borsmustár (rukkola) (szabadföldi)	peronoszpóra, szürkepenész, fehérpenész	2	7	0,8-1,0	300-800	végső levéltömeg elérése BBCH49
(hajtatott)					300-1200	
<b>articsóka</b> (szabadföldi)	lisztharmat, szürkepenész	3	10	0,8-1,0	300-1000	virágzatfejlődés BBCH55
<b>cukkini</b>	lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség	2	10	0,8-1,0	500-800	Teljes érés BBCH89
<b>sárgadinnye, sütőtök, spárgatök</b> (szabadföldi)		3				
(hajtatott)						

<b>szamóca</b> (szabadföldi) (hajtatott)	lisztharmat, gnomóniás betegség, mikoszfereállítás levélfoltosság, antraknózis	3	7	1,0	300-1200	Egy héttel betakarítás előtti állapot BBCH86
<b>díszfák, díszcserjék és dísznövények</b>	lisztharmat, peronoszpóra, alternária, rozsdá, apiognomónia, guignardia, varasodás	2	10	0,6-1,0	800-1500	nincs korlátozás
<b>csicsóka</b>	lisztharmat, fehérpenész	2	14	0,8-1,0	300-600	betakarítás előtt 14 nappal
<b>gyógy- és fűszernövények</b> kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vasfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula konyhakömény, ánizs	peronoszpóra, lisztharmat, rozsdá, fehérpenész, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség	2	14	0,6-1,0	250-500	betakarítás előtt 14 nappal
<b>őszi káposztarepce</b>	termésnövelő hatás, leptoszfériás (fómás)- és szklerotíniás (fehérpenész) betegségek	1	-	0,8-1,0	200-400	Virágzás kezdetétől BBCH 61 a fővirágzat 50%- os nyílásáig BBCH 65
<b>napraforgó</b>	szklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek	2	14	0,8-1,0	200-600	6 leveles állapottól BBCH 16 Virágzat elhajlása, szíromlevelek megjelenéséig BBCH 59

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**Paradicsomban** legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel,

**paprikában** a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén (8-10 naponta) 600-1000 l/ha vízmennyiséggel,

**tojásgyümölcsben** a kórokozók fertőzési veszélyétől függően az oldalhajtások képződésétől érésig 7-10 naponta, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel,

**káposztafélékben** a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel, **gyökérszöcskékben** a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel, **spárgában** a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-800 l/ha vízmennyiséggel, **póréhagymában** a fertőzés észlelésétől 12 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel célszerű kijuttatni.

**Hagymafélékben** peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

**Szárzaborsóban** lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás betegség és rozsda ellen a kezeléseket preventív módon, virágzás körül ajánlott megkezdeni. A fertőzés alakulása szerint a hüvelyképződési időszakban még egy kezelés szükséges lehet.

**Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben** a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

**Torma** gombás betegségei ellen a növényvédő szert előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell kijuttatni. A permetezés szükség esetén 14 nap múlva megismételhető.

**Édesköményben** a permetezéseket előrejelzésre alapozva preventív módon kell elvégezni az említett gombás betegségek ellen 300-600 l/ha lémmennyiséggel.

**Spenót és sóskában** a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni.

**Salátafélékben** a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni.

**Articsókában** a gombaölő szert lisztharmat és szürkepenész ellen lehet felhasználni egy vegetációban összesen 3 alkalommal. A permetezéseket preventív módon, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni.

**Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben** a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni.

**Szamócában** lisztharmat, antraknózis (*Colletotrichum acutatum*) gnomóniás- valamint a levél-foltbetegségek ellen a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, melyet a fertőzési nyomástól függően 2 alkalommal meg lehet ismételni.

**Díszfák, díszcserjék és dísznövények** gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt.

Minden kultúrában fontos a jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazása.

**Csicsókában** a gombaölő szer lisztharmat és fehérpenész ellen használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni.

**Gyógy- és fűszernövényekben** (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vassfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

**Őszi káposztarepcében** gombás betegségek ellen a védekezést tavasszal, a virágzás időszakában, preventív jelleggel, előrejelzésre alapozva javasolt elvégezni a jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazásával. A fertőzésre hajlamosító (hűvös, csapadékos) időjárás, valamint fogékony fajta/hibrid termesztésekor a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

A kezelésnek *termés- és zöldtömeg* növelő hatása is van

**Napraforgóban** levél- szár- és tányérbetegségek ellen a készítmény egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki. A kezeléseket preventív jelleggel, előrejelzésre alapozva, a növények 6-10 pár leveles állapotában, majd a szíromlevelek megjelenésének idején javasolt elvégezni. A fertőzésre hajlamosító időjárás, valamint fogékony fajta/hibrid termesztésekor a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A biológiai hatékonyság szempontjából fontos a permetezés

időpontjának helyes megválasztása és a növény jó permetléfedésének biztosítása.

**A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.**

Hatásmechanizmus:

azoxistrobin: sejtlégzés gátló hatóanyag (FRAC kód: 11)

difenokonazol: szterol bioszintézis gátló hatóanyag (FRAC kód: 3)

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

### III. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

**7. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**


#### 7.1. Veszélyességi besorolás:

##### 7.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	<b>&gt; 2000 mg/kg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>kifejezetten veszélyes</b>
<b>Méhekre való veszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

##### 7.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

#### **Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

<b>H317</b>	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
<b>H332</b>	Belélegezve ártalmas
<b>H400</b>	Nagyon mérgező a vízi élővilágra*
<b>H410</b>	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

\* Címken nem feltüntetendő adat

<b>P261</b>	Kerülje a permet belélegzését.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
<b>P304 + P340</b>	BELÉLGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
<b>P312</b>	Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.
<b>P333 + P313</b>	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### **Kiegészítő veszélyességi információ:**

<b>EUH401</b>	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

#### **7.2. különleges S-mondatok:**

<b>SP 1</b>	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
<b>SPo 2</b>	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
<b>SPe 3</b>	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől <b>50 m</b> távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

#### **5.3.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

#### **IV. Az engedélyokirat 8. b) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:**

#### **8.b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

<b>Kultúra</b>	<b>Várakozási idő (nap)</b>
paradicsom (hajtatott)	7
paprika (hajtatott)	3
tojásgyümölcs (hajtatott)	3
fejes káposzta, bimbós kel,	21
kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli	14
gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, zeller)	14
spárga	_*
póréhagyma	21

vöröshagyma, fokhagyma	14
mogyoróhagyma	14
újhagyma	7
petrezselyemlevél, zellerlevél, kapor, koriander	14
száraz borsó	35
torma	21
édeskömény	14
spenót, sóska	14
fejes saláta, borsmustár (rukkola)	14
articsóka	7
cukkini, sárgadinnye, sütőtök, spárgatök	3
csicsóka	42
szamóca	3
díszfák, díszcserjék, dísznövények	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges
gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vassfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula)	14
konyhakömény, ánizs	14
őszi káposztarepce, napraforgó	56

\* a kezelés a spárgasípok betakarítása után történik

#### **IV. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

##### **12. A növényvédő szer kiszерelése, csomagolása:**

a kiszерelés térfogata/tömege: 250 ml, 1 liter, 5 liter

a csomagolóeszköz anyaga: műanyag flakon, műanyag kanna, kartondoboz

A **250 ml**-es és az **1 l**-es kiszерelések címkéjén a *repce és napraforgó* kultúrára vonatkozó előírásokat nem szükséges feltüntetni. Az **5 l**-es kiszерelés címkéjén elegendő csak a repce és napraforgó kultúrára vonatkozó előírásokat feltüntetni.

A 2018. február 28. után gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyezési eljárás díja 400.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából



Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(421/2017)