

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Neoram 37,5 WG	gombaölő szer	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	rézoxiklorid	5	10	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): lombhullás
		csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszibarack, nektarin, szilva)		5	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): lombhullás
		héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)		30	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): lombhullás
		szőlő		50	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): zsendülés
		paprika		5	7	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Neoram 37,5 WG	gombaölő szer	paradicsom	rézoxiklorid	5	7	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés
		burgonya		5	7	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés
		bab		20	5	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés
		borsó		20	5	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Neoram 37,5 WG	gombaölő szer	Kabakosok (uborka, dinnye, tök)	rézoxiklorid	5	5	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés
		Hagymafélék (vörös-, zöld-, fok- , póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma)		5 (vörös-, zöld-, fok- gyöngy- és sarjadékhagyma) 20 (póréhagyma)	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): termésnövekedés- termésszedés
		cukorrépa		5 (gyökér)	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): betakarítás előtt, a várakozási idő figyelembevételével
		konyha- és édeskömény		20 (édeskömény) 40 (feketekömény, kömény, római kömény, édesköménymag) 50 (édesköménylevél)	rendeltetésszerű felhasználás esetén előírása nem szükséges	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): betakarítás előtt, a várakozási idő figyelembevételével

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Neoram 37,5 WG	gombaölő szer	orvosi csucsor	rézoxiklorid	-	rendeltetésszerű felhasználás esetén előírása nem szükséges	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): betakarítás előtt, a várakozási idő figyelembevételével